

**GARRAPATICIDAS AUTORIZADOS PARA USO EN ZONAS DE CONTROL (ZONA SUCIA)**

PRODUCTO - NOMBRE COMERCIAL	LABORATORIO	COMPOSICIÓN - FORMULACIÓN	CERTIFICADO N°	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	% DE EFICACIA	PODER RESIDUAL ABSOLUTO	PERIODO DE RESTRICCIÓN O RETIRADA	OBSERVACIONES	MARBETES - VER IMPRESOS
ACATAK	NOVARTIS	FLUAZURON 2,5 %	97317	POUR-ON	99,99%	41 DÍAS	PRE FAENA: 42 DÍAS	No sacrificar animales para consumo humano hasta 6 semanas despues del tratamiento. No administrar en animales productores de leche, ni en los 60 días previos al parto.	AGREGAR LINK
ARIOMECTIN 3.15 %	ARIO-Q	IVERMECTINA 3,15 %	11018	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,02%	26 DÍAS	PRE FAENA: 90 DÍAS	No sacrificar animales para consumo humano hasta 90 días despues del último tratamiento. No administrar en animales productoras de leche, ni durante los anteriores 60 días al parto	AGREGAR LINK
ATRAFIX FC POUR-ON	VETANCO	FLUARZURON 2,5 % CIPERMETRINA 5 %	15-056	POUR ON	99,95%	25 DÍAS	45 DÍAS	No sacrificar animales para consumo humano hasta 45 días despues del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción.	AGREGAR LINK
AVOTAN GOLD	MSD - INTERVET ARGENTINA S.A.	FLUARZURON 2,5 % ABAMECTINA 1 %	16-073	POUR ON	100%	21 DÍAS	54 DÍAS	No sacrificar animales para consumo humano hasta 54 días despues del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción. No aplicar en terneros menores de 4 meses de edad.	AGREGAR LINK
BAGOMECTINA AD3E FORTE	BIOGENESIS-BAGO	IVERMECTINA 1 %	01-002	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,67%	9 DÍAS	PRE FAENA: 35 DÍAS	Prefaena bovino: 35 días. No aplicar en animales en lactación, ni dentro de los 35 días antes del parto, cuando la leche se destine para consumo humano.	AGREGAR LINK
BAGOMECTINA LA 3,15% AD3E	BIOGENESIS-BAGO	IVERMECTINA 3,15%	08-033	INYECTABLE-SUBCUTANEO		28 días	Pre faena bovinos: 50 días.	No utilizar en bovinos lecheros cuando la leche se destine a consumo humano. Dosis mayores a 10 ml dividir las en dos puntos.	<a href="#">BAGOMECTINA 3.15 LA AD3E.PDF</a>
BAGOMECTINA STAR	BIOGENESIS-BAGO	IVERMECTINA 3,15 %	15-085	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,09%	17 días	Pre faena: 56 días	No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 56 días del último tratamiento. No administrar a hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.	<a href="#">BAGOMECTINA STAR.PDF</a>
BAYMEC 3,15%	BAYER	IVERMECTINA 3,15%	05-020 (Extensión de certificado de Ivervet AD)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,99%	25 días	Pre faena bovinos: 120 días.	No utilizar en vacas lecheras en producción.	<a href="#">BAYMEC 3.15 (1).pdf</a> <a href="#">BAYMEC 3.15 (2).pdf</a> <a href="#">BAYMEC 3.15 (3).pdf</a>
BAYMEC PROLONG	BAYER	IVERMECTINA 1 %	97055	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,70%	12 DÍAS	PRE FAENA: 42 DÍAS	Prefaena bovinos: 42 días. Preordene: no utilizar en ganado lechero en lactación cuya leche se destine a consumo humano.	AGREGAR LINK
BAYTICOL POUR-ON 1%	BAYER ARGENTINA S.A.	FLUMETRINA 1%	1771	POUR-ON		9 días	Pre faena: 24 horas		<a href="#">BAYTICOL.pdf</a> <a href="#">BAYTICOL POUR ON.pdf</a>
BIOMEQ + 3,5	Biochemiq SA	IVERMECTINA 3,5%	12.218	INYECTABLE-SUBCUTANEO	97,54%	28 días	PRE FAENA: 112 días	No administrar en bovinos cuya leche se destina a consumo humano. No enviar la carne de los animales tratados a consumo humano hasta transcurridos 112 días corridos desde la última aplicación del producto.	<a href="#">BIOMEQ + 3,5</a>

BOVIFORT	BIOGENESIS S.A.	IVERMECTINA 1 %	97000	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,85%	19 DÍAS	PRE FAENA: 49 DÍAS	Prefaena bovinos: 49 días. No utilizar en animales en ordeño cuya leche sea destinada a consumo humano o para su industrialización.	AGREGAR LINK
BUTOX POUR-ON 100	Intervet Argentina S.A.	DELTAMETRINA 1%	91233	POUR-ON		7 días	No hay restricciones para el uso de la carne y/o leche de los animales tratados	No hay restricciones para el uso de la carne y/o leche de los animales tratados	<a href="#">BUTOX POUR ON.PDF</a>
BYTEC 3,15	Tecnofarm	IVERMECTINA 3,15%	09-022 (Extensión de Certificado de MELTRA ENDECTOCIDA 3,15%)	INYECTABLE - SUBCUTANEO		29 días	Prefaena bovinos: 100 días. Prefaena ovinos: 27 días. Preordeño: no administrar a vacas productoras de leche para consumo humano.	Extensión de Certificado de MELTRA ENDECTOCIDA 3,15%	<a href="#">BYTEC 3.16</a>
DECTOMAX	PFIZER	DORAMECTINA 1 %	1808	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,84%	9 DÍAS	PRE FAENA: 50 DÍAS	Prefaena bovinos: 50 días. Prefaena ovinos: 35 días. Preordeño: 28 días	AGREGAR LINK
DERRAMIN	BROUWER SA	FIPRONIL 1%	99241 (Extensión de Certificado del ECTOLINE)	POUR ON	99,22%	1 día	Prefaena: 100 días. Exclusivo para bovinos de carne.	Prefaena: 100 días. Exclusivo para bovinos de carne. No utilizar en otras especies animales.	AGREGAR LINK
DERRIBANTE IXO PO	ACA	FLUARZURON 2,5%	14-008 (Extensión de Certificado de ECTO TAK)	POUR-ON	99,50%	19 días	Prefaena: 54 días. No administrar en vacas lecheras	Prefaena: 54 días. No administrar en vacas lecheras	DERRIBANTE IXO PO.PDF
DORAGEN	GENERAR	DORAMECTINA 1%	14-110 (Extensión del Certificado de D.R.M 1%)	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,62%	7 días	Prefaena: 35 días.	Prefaena: Bovinos 35 días y Ovinos 33 días. NO utilizar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o a industrialización. En Ovinos NO administrar durante el periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 60 días previos al parto.	AGREGAR LINK
DORAMECTINA VASA	VASA	DORAMECTINA 1%	14-110 (Extensión del Certificado de D.R.M 1%)	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,62%	7 días	Prefaena: 35 días.	Prefaena: Bovinos 35 días y Ovinos 33 días. NO utilizar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o a industrialización. En Ovinos NO administrar durante el periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 60 días previos al parto.	DORAMECTINA VASA.PDF
DORANDEX	ACA	DORAMECTINA 1%	14-110 (Extensión del Certificado de D.R.M 1%)	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,62%	7 días	Prefaena: 35 días.	Prefaena: Bovinos 35 días y Ovinos 33 días. NO utilizar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o a industrialización. En Ovinos NO administrar durante el periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 60 días previos al parto.	DORANDEX.PDF
D.R.M 1%	ZOOVET	DORAMECTINA 1%	14-110	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,62%	7 días	Prefaena: 35 días.	Prefaena: Bovinos 35 días y Ovinos 33 días. NO utilizar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o a industrialización. En Ovinos NO administrar durante el periodo de lactancia ni tampoco dentro de los 60 días previos al parto.	D.R.M 1%
ECTO TAK	LAB. ZOOVET	FLUARZURON 2,5%	14-008	POUR-ON	99,50%	19 días	Prefaena: 54 días. No administrar en vacas lecheras	Prefaena: 54 días. No administrar en vacas lecheras	<a href="#">ECTO TAK0001.jpg</a>
ECTOLINE	MERIAL Argentina S.A.	FIPRONIL 1%	99241	POUR-ON	99,22%	1 día	Prefaena: 100 días. Exclusivo para bovinos de carne.	Prefaena: 100 días. Exclusivo para bovinos de carne. No utilizar en otras especies animales.	<a href="#">ECTOLINE.PDF</a>

ENDECTION 3,15%	LAB. ZOOVET	IVERMECTINA 3,15%	08-224 (Extensión de Certificado de ENDECTOSAN)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99%	32 días	Prefaena: 110 días.	Prefaena: 110 días. Preordeña: no aplicar en vacas de ordeña cuya leche vaya a consumo alimentario humano.	<a href="#">ENDECTION 3.15</a>
ENDECTION CP	LAB. ZOOVET	IVERMECTINA 1%	03-293	INYECTABLE-SUBCUTANEO		9 días	Prefaena: 50 días.	Prefaena: 50 días. No administrar en vacas lecheras en producción, ni dentro de los 28 días antes del parto cuando la leche se destine a consumo humano.	<a href="#">ENDECTION.PDF</a>
ENDECTOMICIN ADE 4%	LAB. ZOOVET	IVERMECTINA 4%	14-111	INYECTABLE	99,43%	15 DÍAS	Prefaena. BOVINOS: 54 días - OVINOS: 33 DÍAS.	BOVINOS: No sacrificar animales para consumo humano hasta 54 días despues del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción para consumo humano. OVINOS: No sacrificar animales para consumo humano hasta 33 días despues del último tratamiento. No administrar durante el periodo de lactancia, ni tampoco dentro de los 60 días anteriores al parto.	<a href="#">AGREGAR LINK</a>
ENDECTOSAN	INST ROSENBUSCH	IVERMECTINA 3,15%	08-224	INYECTABLE	99%	32 días	Prefaena: 110 días. Preordeña: no aplicar en vacas de ordeña cuya leche vaya a consumo alimentario humano.		<a href="#">ENDECTOSAN LA (1).pdf</a>
									<a href="#">ENDECTOSAN LA (2).JPG</a>
FENOMAX PLUS 3,5% LA	MSD - INTERVET ARGENTINA S.A.	IVERMECTINA 2,25% - ABAMECTINA 1,25%	16-075	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,55%	27 DÍAS	Prefaena. BOVINOS: 150 días - OVINOS: 70 DÍAS.	BOVINOS: No sacrificar animales para consumo humano hasta 150 días despues del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción para consumo humano. No administrar en terneros menores de 16 semanas o con menos de 120 kg. OVINOS: No sacrificar animales para consumo humano hasta 70 días despues del último tratamiento.	AGREGAR LINK
FLOK	BIOGENESIS-BAGO	DORAMECTINA 1,1 %	13-043	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,47%	11 DÍAS	PRE FAENA: 44 DÍAS	No sacrificar animales bovinos y ovinos para consumo humano hasta 44 días después del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción.	AGREGAR LINK
FLOK 3,15 %	BIOGENESIS-BAGO	DORAMECTINA 3,15 %	13-108	INYECTABLE - SUBCUTANEO	98,86%	24 DÍAS	PRE FAENA: 52 DÍAS	No sacrificar animales bovinos y ovinos para consumo humano hasta 52 días después del último tratamiento. No administrar en vacas lecheras en producción.	AGREGAR LINK
FORBOX	BIOGENESIS-BAGO	FLUARZURON 2,5%	12-195	POUR-ON	99,45%	18 DÍAS	PRE FAENA: 42 DÍAS	Entre el último tratamiento y la faena para consumo humano deben transcurrir 6 semanas. No sacrificar para consumo humano terneros menores de 10 meses de edad que estan siendo amamantados por vacas tratadas. No administrar en vacas lecheras en producción.	FORBOX.PDF
INANDEX 3,15 MAX ACA	ACA	IVERMECTINA 3,15%	05-147 (Extensión de certificado de Promectina Plus 3,15)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,49%	29 días.	Prefaena bovinos: 50 días. Prefaena ovinos: 30 días.	Prefaena bovinos: 50 días. Prefaena ovinos: 30 días. No administrar a bovinos ni ovinos cuya leche se destine a consumo humano. No usar en ganado lechero en lactación, ni 50 días antes del parto.	<a href="#">INANDEX 3.15</a>
IVER 100 D	PHARMAVET	IVERMECTINA 1%	01-118	INYECTABLE		7 días	Prefaena: 50 días. Preordeña: No administrar en vacas en producción		<a href="#">Iver 100-D (1).jpg</a>
									<a href="#">Iver 100-D (2).jpg</a>
									<a href="#">Iver 100-D (3).jpg</a>
									<a href="#">Iver 100-D (4).jpg</a>

									<a href="#">Iver 100-D (5).jpg</a>
									<a href="#">Iver 315-D (1).pdf</a>
									<a href="#">Iver 315-D (2).pdf</a>
									<a href="#">Iver 315-D (3).pdf</a>
									<a href="#">Iver 315-D (4).pdf</a>
IVER 3,15% D	PHARMAVET	IVERMECTINA 3,15%	07-041	INYECTABLE		28 días	Prefaena: 50 días. Preordeñe: No administrar en vacas en producción láctea		
IVERNORT 3,15%	NORT SA	IVERMECTINA 3,15%	10-007	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,10%	28 días	Prefaena: 97 días		<a href="#">IVERNORT 3.15.PDF</a>
IVERTON LA 1,25%	Farmagrup SA	IVERMECTINA 1,25%	07-251	INYECTABLE-SUBCUTANEO	98,26%	21 días	Cerdos prefaena: 28 días. Bovino prefaena: 35 días.	Cerdos prefaena: 28 días. Bovino prefaena: 35 días. Preordeñe: No administrar a vacas en ordeño. No administrar 28 días parto	<a href="#">IVERTON LA 1.25.PDF</a>
IVERTON LA 3,50 Gold	Farmagrup SA	IVERMECTINA 3,5%	10-018	INYECTABLE	99,37%	38 días	Prefaena bovinos:94 días. Prefaena ovinos: 45 días.	Prefaena bovinos:94 días. Prefaena ovinos: 45 días. No utilizar ovinos	<a href="#">Iverton LA 3.50 (1).pdf</a> <a href="#">Iverton LA 3.50 (2).pdf</a>
IVERVET AD	VETANCO S.A.	IVERMECTINA 3,15 %	05-020	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,99%	25 DÍAS	120 DÍAS	Prefaena Bovinos: 120 días. Prefaena ovinos: 60 días. No utilizar en bovinos y ovinos en período de lactancia.	AGREGAR LINK
IVOGEN LA	Laboratorio Generar	IVERMECTINA 1%	03-293 (Extensión de Certificado de ENDECTION CP)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99%	9 días	Prefaena bovinos:50 días. Prefaena porcinos: 28 días.	Prefaena bovinos:50 días. Prefaena porcinos: 28 días. Preordeñe:No administrar en vacas lecheras en producción, ni dentro de los 28 días antes del parto cuando la leche se destine a consumo humano.	<a href="#">IVOGEN LA.PDF</a>
IVOMEK GOLD	MERIAL	IVERMECTINA 3,15 %	99247	INYECTABLE - SUBCUTANEO	100%	23 DÍAS	122 DÍAS	Prefaena bovinos:122 días. No tratar a vacas productoras de leche para consumo humano.	AGREGAR LINK
MEGAMECTIN 3,15%	NOVARTIS	IVERMECTINA 3,15%	05-020 (Extensión de certificado de IVERVET AD)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,99%	25 días	Prefaena bovinos:120 días. Prefaena ovinos: 60 días.	Prefaena bovinos:120 días. Prefaena ovinos: 60 días. No utilizar en vacas ni ovejas lecheras en producción	<a href="#">MEGAMECTIN 3.15.PDF</a>
MEGAMECTIN 3,5%	NOVARTIS	IVERMECTINA 3,5%	04-284	INYECTABLE-SUBCUTANEO		23 días	Prefaena bovinos: 4 meses.	Prefaena bovinos: 4 meses. No utilizar en bovinos en período de lactancia. No administrar en vacas lecheras en producción.	<a href="#">MEGAMECTIN 3.5.PDF</a>
MELTRA Eendectocida 3,15%	BROUWER SA	IVERMECTINA 3,15%	09-022	INYECTABLE-SUBCUTANEO	98,15%	29 días	Prefaena bovinos: 100 días. Prefaena ovinos: 27 días.	Prefaena bovinos: 100 días. Prefaena ovinos: 27 días. Preordeñe: no administrar a vacas productoras de leche para consumo humano.	<a href="#">MELTRA ENDECTOCIDA.PDF</a>
NECAVERM	Instituto Rosenbusch S.A.	ABAMECTINA 1,13%	95392	INYECTABLE-SUBCUTANEO		5 días	Prefaena bovinos: 60 días. Prefaena cerdos y ovinos: 75 días.	Prefaena bovinos: 60 días. Prefaena cerdos y ovinos: 75 días. Preordeñe: no tratar vacas y ovejas en ordeño.	<a href="#">NECAVERM.PDF</a>
OVERLINE LARGE DUO	OVER	FIPRONIL 1% IVERMECTINA 0,5%	18-022	POUR ON	99,69%	30 DIAS	71 DIAS	No destinar a faena animales tratados para consumo humano hasta después de 71 días del último tratamiento. No destinar a vacas lechera en producción.	LINK
OVERTAK FULL	OVER	FLUAZURON 2,5 % IVERMECTINA 0,5%	17-115	POUR ON	100,00%	26 DIAS	20 DIAS	No destinar a faena animales tratados para consumo humano hasta después de 20 días del último tratamiento. No destinar a vacas lechera en producción.	LINK
PROMECTINA PLUS 3,15%	Proagro SA	IVERMECTINA 3,15%	05-147	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,49%	29 días.	Prefaena bovinos: 50 días. Prefaena ovinos: 30 días.	No administrar a bovinos ni ovinos cuya leche se destine a consumo humano. No usar en ganado lechero en lactación, ni 50 días antes del parto.	<a href="#">PROMECTINA PLUS 3.15.PDF</a>
TRESQUINCE	Leon Pharma	IVERMECTINA 3,15%	11-018 (Extensión de Certificado del ARIOMECTIN 3,15%)	INYECTABLE-SUBCUTANEO	99,02%	26 días	Prefaena: 90 días.	No administrar en animales productores de leche ni en los últimos 60 días parto.	<a href="#">TRESQUINCE.pdf</a>

ULTRAMECTIN ADE 4%	PRODUCTOS AGROGANADEROS SRL	IVERMECTINA 4%	14-111 (Extensión de Certificado del ENDECTOMICIN ADE 4%)	INYECTABLE	99,43%	15 DÍAS	Prefaena. BOVINOS: 54 días - OVINOS: 33 DÍAS.	BOVINOS: No sacrificar animales para consumo humano hasta 54 días despues del último	<a href="#">AGREGAR LINK</a>
VERMECTIN LA PREMIUN	OVER	IVERMECTINA 3, 15 %	99205	INYECTABLE - SUBCUTANEO	99,99%	20 DÍAS	65 DÍAS	Prefaena: 65 días. Leche: no tratar vacas productoras de leche para consumo humano, ni tampoco dentro de los 60 días anteriores al parto.	